red natural de Aragón

HOY HABLAMOS DE...

GRULLA COMÚN

(Grus grus)

Familia:Gruidae

Catalogación:
C.EE.AA. de Aragón: **SENSIBLE A LA ALTERACIÓN DEL HABITAT** (Decreto 49/1995, de 28 de marzo)
C.N.E.A.: I**NTERÉS ESPECIAL**
(Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo)

DESCRIPCIÓN

Ave de gran tamaño, de 114-130 cm de longitud y 200-230 cm de envergadura. Cuello y patas muy largos que le dan un aspecto erguido en el suelo. Ambos sexos son similares. Las aves adultas y subadultas presentan coloración general gris pizarra, cabeza y parte superior del cuello negros, y una ancha franja blanca que parte del ojo y se prolonga por la cara hasta la zona media del cuello. Píleo desnudo de color rojo muy llamativo. El dorso en el caso de los ejemplares subadultos presenta tonalidades marrones ocráceas dando un aspecto gris sucio. Destaca en la región posterior un penacho de plumas que corresponden a las terciarias y últimas secundarias, y que forman una “falsa cola”. Alas largas y amplias, con borde negro debido a la coloración de las rémiges. Patas largas y negruzcas. Pico amarillento sucio, más corto que en garzas y cigüeñas.

El joven del año se distingue por tonalidad general pardusca, y cabeza y cuello de coloración parda o pardo rojiza, careciendo de la franja blanca y de la mancha negra que adquieren después del primer invierno.

El macho adulto puede llegar a ser distinguible de la hembra por su mayor tamaño y corpulencia.

Tiene un andar lento, y arranca el vuelo tras una corta carrera. Batir de alas lento, planeando a menudo. Típicamente en vuelos de formación. Voz atrompetada, potente y característica.

red natural de Aragón

HOY HABLAMOS DE...

GRULLA COMÚN

(Grus grus)

ECOLOGÍA

En primavera-verano los adultos tienen un comportamiento territorial. Ocupan zonas pantanosas y lindes de bosque y se alimentan básicamente de invertebrados y pequeños vertebrados. Las aves inmaduras y juveniles forman bandos gregarios, y ocupan con frecuencia terrenos agrícolas. Toda la población pasa en otoño-invierno a tener un comportamiento gregario. Forma dormideros comunales, y se alimenta fundamentalmente en campos de labor y en menor medida en zonas de dehesa, manteniendo una estrategia de gregarismo continuado a lo largo del invierno que le facilita un mayor rendimiento de los recursos disponibles (ALONSO & al. 1984). Las parejas reproductoras exitosas sacan adelante 1 o 2 pollos .

La llegada de los contingentes invernales a Aragón se inicia en la segunda quincena de octubre, y se prolonga, en función de la estancia en las localidades francesas, hasta el mes de diciembre. El paso prenupcial comienza a mediados de febrero. Después de la segunda semana de marzo se observan escasos efectivos correspondientes a ejemplares rezagados.

En el tramo final del paso prenupcial se observa en Gallocanta un incremento importante en el porcentaje de jóvenes que indica que en los momentos finales de la invernada, y con el inicio de la migración, se produce la emancipación juvenil.

En las horas centrales la mayor parte de los individuos se dedican a beber y sestear en zonas de prados, balsas y arroyos donde tengan disponibilidad de agua dulce (ALONSO & al. 1985, ALONSO & ALONSO 1992).

Texto: Javier Samprieto